

パラメータ	ダパグリフロジン群 (N = 2,373)	プラセボ群 (N = 2,371)
年齢 --- 歳	66.2 ± 11.0	66.5 ± 10.8
女性 --- 人(%)	564 (23.8)	545 (23.0)
体格指数 --- kg/m2	28.2 ± 6.0	28.1 ± 5.9
人種 --- 人(%)		
白人	1662 (70.0)	1671 (70.5)
黒人	122 (5.1)	104 (4.4)
アジア人	552 (23.3)	564 (23.8)
その他	37 (1.6)	32 (1.3)
地域 --- 人(%)		
北アメリカ	335 (14.1)	342 (14.4)
南アメリカ	401 (16.9)	416 (17.5)
ヨーロッパ	1094 (46.1)	1060 (44.7)
アジア太平洋地域	543 (22.9)	553 (23.3)
NYHAクラス分類 --- 人(%)		
II	1606 (67.7)	1597 (67.4)
III	747 (31.5)	751 (31.7)
IV	20 (0.8)	23 (1.0)
心拍数 --- beats/min	71.5 ± 11.6	71.5 ± 11.8
収縮期血圧 --- mmHg	122.0 ± 16.3	121.6 ± 16.3
左室駆出率 --- %	31.2 ± 6.7	30.9 ± 6.9
NT-proBNP (IQR) 中央値 --- pg/mL	1428 (857～2655)	1446 (857～2641)
心不全の主な原因 --- 人(%)		
虚血性	1316 (55.5)	1358 (57.3)
非虚血性	857 (36.1)	830 (35.0)
不明	200 (8.4)	183 (7.7)
既往歴 --- 人(%)		
心不全による入院	1124 (47.4)	1127 (47.5)
心房細動	916 (38.6)	902 (38.0)
糖尿病	993 (41.8)	990 (41.8)
平均eGFR --- ml/min/1.73 m²	66.0 ± 19.6	65.5 ± 19.3
<60/min/m² の割合 --- 人/母数(%)	962 / 2372 (40.6)	964 / 2371 (40.7)
デバイス治療歴 --- 人(%)		
植込み型除細動器	622 (26.2)	620 (26.1)
心臓再同期療法	190 (8.0)	164 (6.9)
心不全治療薬 --- 人(%)		
利尿剤	2216 (93.4)	2217 (93.5)
アンギオテンシン変換酵素阻害薬	1332 (56.1)	1329 (56.1)
アンギオテンシンII受容体拮抗薬	675 (28.4)	632 (26.7)
Sacubitril-valsartan (本邦未承認)	250 (10.5)	258 (10.9)
β 遮断薬	2278 (96.0)	2280 (96.2)
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬	1696 (71.5)	1674 (70.6)
ジギタリス	445 (18.8)	442 (18.6)
血糖降下薬 --- 人/母数(%)		
ビグアナイド	504 / 993 (50.8)	512 / 990 (51.7)
スルホニル尿素	228 / 993 (23.0)	210 / 990 (21.2)
DPP-4阻害薬	161 /993 (16.2)	149 / 990 (15.1)
GLP-1受容体刺激薬	11 / 993 (1.1)	10 / 990 (1.0)
インスリン	274 / 993 (27.6)	266 / 990 (26.9)